

Kleiputten 't Hoge 1983		2013 (2014)
Broedende of waarschijnlijk broedende soorten		In deze kolom krijgen sommige soorten een andere kleur en dus een andere broedwaarde.
Wilde eend	- 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - op 10.05 nog een ander koppel aanwezig - regelmatig worden ongepaarde ex. waargenomen (zowel w. als m.)	- 4 man + 1 koppel aanwezig op 11/04 - 4 man aanwezig op 21/04 - In 2014 koppel met juv. Aanwezig
Sperwer		- 1 koppel balts op 11/04 - op en rond het nest - 24/06 3 jongen zichtbaar - 1/07 4 juv.
Fazant		- 2 koppels aanwezig op 11/04 - 2 w + 1 m. op 21/04 - 05/06 10 ex. Hen met pulli.
Waterhoen	- 2 koppels : 1 nabij de grootste vijver, 1 in het parkgebied in moerasje met wilgenopslag	- 1 ex. Vlucht in riet op 21/04 - 1 koppel met juv. (14/06) - In 2014 juv. nabij paaivijvers. Ook eerder in Natuurgebied 2 koppels met juv.
Holenduif		- min 4 ex. Tp. Op 21/04 - 11/06 1 ex. Ter plaatse - In 2014 min. 2 territoria
Houtduif	- 1 broedend koppel op hoge Ratelpopulier	- 3 ex. Aanwezig op 11/04 - 1 op nest + 5 ex. Op 21/04 - in 2014 3 territoria
Tortel	- 2 koppels waarvan hun territoria reikte tot buiten de kleiputten	
Koekoek	- 1 koppel voortdurend waar te nemen. De grootste van het gebiedje bleek ongeveer overeen te komen met de totale oppervlakte van hun territorium	gehoord op 1 juni 2014
Grote bonte specht		- 3 ex. Tp o.a. balts - 1 juni 2014 bezet nest met hoorbare jongen
Groene Specht		- 2 gelijktijdig roepende ex. op 11/04 - 1 gehoord op 21/04 - 1 juni 2014 bezet nest met hoorbare jongen. Op 4 locaties horen roepen.
Graspieper	- 1 koppel in weide, dank zij het feit dat het vee dit jaar slechts rond half juni in de weide werd gelaten	

Winterkoning	<ul style="list-style-type: none"> - 1 koppel - 2 koppels die waarschijnlijk in een aanpalende tuin broedden maar waarvan het territorium voor een groot gedeelte in de kleiputten ligt. 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 zangposten op 11/04 - 5 zangposten op 21/04 - aanwezig op 14/06 - aanwezig op 24 juni - 1 juni 2014 Koppel met bedelende juv. 11 zingende mannetjes aangetroffen. Divers territoriagedrag.
Heggenmus	<ul style="list-style-type: none"> - 4 à 5 koppels - 1 à 2 koppels die hier enkel komen fourageren. 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 ex. op 11/04 - niks op 21/04 - 24/04 baltsend (DDD)
Roodborst	<ul style="list-style-type: none"> - Er werd enkel op 9.06 een zangpost gesitueerd in het centrale wilgenstruweel. Toch mogen we hier spreken van een waarschijnlijk broedgeval, daar de soort nog werd gehoord na de inventarisatieperiode. 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 zangposten op 11/04 - 1 aanwezig in naastliggende privétuin - Juv Roodborst op 14/06 - 24/06 1 tp - 1 juni 2014 nestindicerend gedrag. Met voedsel.
Merel	<ul style="list-style-type: none"> - 4 à 7 koppels met nest in de kleiputten - 1 à 3 koppels die hier fourageren maar hier hoogstwaarschijnlijk niet broeden. 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 zangposten op 11/04 - 3 zangposten op 21/04 - ter plaatse op 24 juni - in 2014 3 territoria waargenomen
Zanglijster	<ul style="list-style-type: none"> - sporadisch werd een zangpost vastgesteld. Deze lagen meestal aan de rand van het gebied. Voor deze soort waarschijnlijk slechts 1 broedend koppel. De andere wnm. Duiden op elders broedende vogels. 	<ul style="list-style-type: none"> - 22/04 zingend (VAC)
Bosrietzanger	<ul style="list-style-type: none"> - 2 koppels nabij de grootste vijver en aanpalende struwelen. 	
Kleine karekiet	<ul style="list-style-type: none"> - 2 koppels in rietvijvertjes aan de W-zijde van het natuurgebied. - 1 nest ervan werd bezet door een Koekoeksjong, dat echter verloren ging. 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 zangposten aan karekietvijver 14/06 - 2 zangposten aan karekietvijver 24/06 - 1 juni 2014 zang aan karekietvijver
Spotvogel	<ul style="list-style-type: none"> - 1 koppel aan de rand van Hoogstamwilgenstruweel. 	
Tuinfluitier	<ul style="list-style-type: none"> - 3 koppels, meestal waar ook hogere bomen (i.c. Knotwilgen) te vinden zijn. Allemaal in het natuurgebied. 	
Zwartkop	<ul style="list-style-type: none"> - 4 koppels, telkens in Wilgen- of Espenstruweel van het natuurgebied. 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 zangposten op 21/04 - zangpost 14/06 - 1 juni 2014 3 zangposten
Tjiftjaf	<ul style="list-style-type: none"> - Dit ideale biotoop voor deze soort herbergt 3 koppels. 	<ul style="list-style-type: none"> - 7 zangposten op 11/04 - 2 zangposten op 21/04 - 2 zangposten 14/06 - aanwezig op 24/06 - 1 juni 2014 7 a 8 zangposten
Fitis	<ul style="list-style-type: none"> - 4 koppels, verspreid over het natuurgebied. 	
Grauwe vliegenvanger	<ul style="list-style-type: none"> - 1 koppel aan de rand van het natuurgebied en de weide. 	

Matkop	- Slechts onregelmatig baltsroep vanuit het oudste Wilgenstruweel. Maar, gezien het ideale biotoop, toch hoogstwaarschijnlijk broedvogel.	
Koolmees	- Vanaf 30.05 1 koppel rondzwerfend met 3 juv. over gans het gebiedje waar te nemen. Wrsch. broedvogel.	- 2 zangposten op 11/04 - 2 zangposten op 21/04 - 1 juni 2014 zeker 2 koppels met bedelende jongen.
Ekster	- Overall steeds 1 à 2 ex. waar te nemen. Wrsch. 1 broedend koppel.	- 2 ex. Op 11/04 - nestbouw op 21/04 - 5/06 1 uitgevlogen jong - 1/6/2014 roepende uitgevlogen jongen
Gaai		- 2 of 4 ex. Aanwezig op 11/04 - 4 ex aanwezig op 21/04 waarvan 2 verjaagd door sperwer - 1 juni 2014 -min. 2 territoria waargenomen.
Zwarte kraai		- 1 koppel op nest op 11/04 - 1 ex verjaagd door sperwer - aanwezig op 24 /06 - eind mei jongen aanwezig in sperwernest van vorig jaar. 1 juni 2014 jongen uitgevlogen
Groenling	- min. 2 koppels. Ze broedden echter zeer dicht bij elkaar, zodat het niet uitgesloten is dat er meer koppels gebroed hebben in een kleine kolonie. Ze ondernemen voedselvluchten naar omliggende tuinen.	
Kneu	- 1 à 5 koppels : 1 koppel met een volledig territorium in de kleiputten; 4 randgevallen met de kleiputten als gedeeltelijk territorium. Hun nest ligt misschien buiten het gebied.	
Rietgors	- 1 zangpost in het riet langs de grootste vijver. Wsch. Broedvogel.	
Mogelijk broedende vogelsoorten		
Turkse tortel	- Er worden regelmatig fouragerende ex. Waargenomen die elders schijnen te broeden. - Misschien 1 broedend koppel in centraal wilgen struweel.	- aanwezig buiten het gebied op 21/04
Grote lijster	- Deze soort was hier veel waar te nemen maar vertoefde even vaak in de nabijgelegen boomgaard.	

Braamsluiper	- Op 09.05 en 10.05 : hevige zang op bouwzone, daarna niet meer waargenomen hier. - Op 30.05 : 1 z.p. aan de andere kant van de kleiputten (gedeeltelijk territorium en elders broedend?)	
Grasmus	- mogelijk broedgeval in Z-wilgenstruweel maar dan ligt het territorium ook buiten de kleiputten.	
Pimpelmees	- Enkel op 30.05 1 koppel met juv. Aan de rand van de kleiputten waargenomen. Heeft wsch. gebroed in aanpalende tuin.	- Baltsend koppel op 11/04 - 2 zangposten op 21/04 - Aanwezig met juv. 14/06
Staartmees		- 1 à 2 koppels aanwezig op 11/04 - 15/04 2 ex.nestbouw (Eddy Scheinpflug) - niet aanwezig op 21/04
Spreeuw	- Wordt sporadisch zingend aangetroffen. Wsch. Broedend in nabijgelegen boomgaard of tuin.	- 1 overvliegend op 21/04
Huismus	- Wegens weinig territoriale gedragingen is het moeilijk het aantal broedende koppels te bepalen. 's Avonds komen veel Mussen slapen in de wilgen.	
Vink		- 1 ex. Gehoord op 11/04 - 1 x gehoord op 21/04

Niet-broedende vogelsoorten

Hieronder staan een paar soorten vermeld die niet broeden in de kleiputten, maar hier toch regelmatig komen foerageren tijdens de broedtijd. De kleiputten zijn dus een deel van hun territorium.

Blauwe reiger	- Vindt hier voldoende amfibieën als voedsel. Het betreft hier bijna zeker exemplaren afkomstig van de Gaverkolonie.	- bezoekt regelmatig de karekietvijver naar voedsel.
Steenuil		- 13/02 roepende steenuil (Freddy Deckers)
Bosuil		- 31/01 Hoogstwaarschijnlijk 2 ex. (Ward Tamsyn)
Gierzwaluw	- Vooral 's avonds komen veel Gierzwaluwen zich voeden met de overvloed aan insectjes die boven de kleiputten vliegen.	
Boerenzwaluw	- Gans de dag door fouragerend in de kleiputten.	
Huiszwaluw	- Regelmatig waar te nemen tussen de boerenzwaluwen.	
Witte kwikstaart	- Nu en dan fouragerend op de gipsplaat van de grootste vijver.	
Ringmus	- Sporadisch voedselzoekend aan de rand van het gebied.	
Boomkruiper		Aanwezig buiten broedperiodes
Goudhaan		Aanwezig buiten broedperiodes

Resultaat:		
Zeker broedende soorten	20	14
Wrsch. broedende soorten	6	8
Mogelijk broedende soorten	6	2
Soorten die tijdens de broedtijd komen foerageren	6	3
Totaal:	38	27

Broedvogelonderzoek: vanwege natte maanden mei-juni 2013 werden in 2014 nog enkele bijkomende inventarisaties uitgevoerd.

Conclusie:

Minder soorten komen tot broeden.

Verdwenen: tortel, graspieper, bosrietzanger, spotvogel, tuinfluiter, fitis, grauwe vliegenvanger, matkop, groenling, kneu, grote lijster?, braamsluiper, grasmus

Nieuw: groene specht, grote bonte specht, sperwer, fazant, holenduif, gaai, zwarte kraai, staartmees?